بالينوزار ٧٥ مجم كبسولات جيلاتينية صلبة

بالينوزار ١٥٠ مجم كبسولات جيلاتينية صلبة

اقرأ هذه النشرة قبل البدء في تناول بالينوزار وفي كل مرة تتناول فيها الدواء. قد تكون هنا كمعلومات جديدة. قد تحتاج هذه المعلومات إلى التحدث مع طبيبك عن حالتك الصحية أو العلاج. إذا كان لديك أي أسئلة عن بالينوزار إسأل طبيبك أو الصيدلي.

التركيب :

بالينوزار ٧٥ مجم: تحتوى كل كبسولة جيلاتينية صلبة على ٧٥ مجم بريجابالين كمادة فعالة

بالينوزار ١٥٠ مجم : تحتوى كل كبسولة جيلاتينية صلبة على ١٥٠ مجم بريجابالين كمادة فعالة

المواد السواغ :

بالينوزار ٧٥ مجم : لاكتوز أحادى الماء، ماغنسيوم ستيريت، بودرة تلك، جيلاتين، تيتانيوم ثنائى الأكسجين، لون أصفر كوينولين، لون أحمر (carmosine red) ، لون أحمر (ponceau red) ، لون أزرق لامع (brilliant blue)

بالينوزار ١٥٠ مجم : لاكتوز أحادى الماء، ماغنسيوم ستيريت، بودرة تلك، جيلاتين، تيتانيوم ثنائى الأكسجين، لون أصفر كوينولين، لون أحمر (ponceau red) ، لون أزرق لامع (brilliant blue)

دواعى الاستعمال :

بالينوزار هودواء يستخدم في البالغين ١٨ عاما فما فوق لعلاج:

- الآم الأعصاب التالفة (ألم الاعتلال العصبي) الذي يحدث مع مرض السكري
- الآم الأعصاب التالفة الذي يلي شفاء من الهربذس النطاقى
- النوبات الجزئية عندما يتم تناوله جنبا إلى جنب مع الأدوية الأخرى التى تعالج النوبات
- الألم العضلي الليفي (ألم في جميع أنحاء الجسم)
- الآم الأعصاب التالفة الذي يتبع الإصابة فى الحبل الشوكى لم تتم دراسته بريجابالين في الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٨ سنة من العمر.

من لا يجب أن يتناول بالينوزار؟

لا تتناول بالينوزار إذا كان لديك حساسية لبريجابالين أو أى من المكونات الأخرى لبالينوزار.

انظر نهاية هذه النشرة للحصول على قائمة كاملة بمكونات بالينوزار.

المرضى الذين يعانون من مشاكل وراثية نادرة من عدم تحمل الجالاكتوز أو نقص اللاكتاز أو سوء امتصاص الجلوكوز جالاكتوز يجب ألا يتناولوا هذا الدواء

كيف ينبغي أن أتناول بالينوزار؟

- تناول بالينوزار تماما كما وصفه الطبيب لك. سوف يخبرك الطبيب بجرعة التى يجب أن تتناولها ومتى تتناولها.

تناول بالينوزار في الأوقات نفسها كل يوم.

- يمكن أن يتم تناول بالينوزار معأ وبدون الطعام.
- قد يغيرطبيبك الجرعة. لاتغيرالجرعة من دون التحدث مع طبيبك.
- لا تتوقف عن تناول بالينوزار من دون التحدث مع طبيبك. إذا توقفت عن تناول بالينوزار فجأة يمكن أن يحدث صداع، غثيان، إسهال، نوم غير مريح، زيادة التعرق، أو قد يشعرون بالقلق. إذا كان لديك مرضى الصرع و توقفت عن تناول بالينوزار فجأة،قد تظهرعليك بعض النوبات في كثيرمن الأحيان. تحدث مع طبيبك حول كيفية وقف بالينوزار ببطء.
- إذا نسيت تناول جرعة، تناولها حالما تتذكر. إذا كان الوقت تقريبا هو ميعاد الجرعة التالية، فقط تخطي الجرعة المنسية. تناول الجرعةالتالية في الوقت العادي الخاص بك. لاتتناول جرعتين في نفس الوقت.
- إذا كنت تتناول بالينوزارأكثرمن اللازم،اتصل بالطبيب،أوإذهب إلى أقرب غرفة طوارئ على الفور.

ماهي الآثارالجانبية المحتملة لبالينوزار؟

الأثار الجانبية المحتملة:

تشير الأثار العكسية فى مرحلة ما بعد التسويق: صعوبة فى التنفس، ضعف التنفس

بالينوزارقد يتسبب في حدوث آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك:

- انظر "ما هي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن بالينوزار؟"
- مشاكل في العضلات،آلام في العضلات،ألم أو ضعف. إذا كان لديك هذه الأعراض، و خاصة إذا كنت تشعر بالإعياء ولديك حمى،أخبر طبيبك فورا.
- مشاكل فى حاسة الإبصاربما في ذلك عدم وضوح الرؤية. أخبر طبيبك إذا كان لديك أي تغيرات في حاسة الإبصار.
- زيادة الوزن. إذا كنت تعانى من مرض السكر،وزيادة الوزن قد تؤثرعلى التحكم فى مرض السكر.
- زيادة الوزن يمكن أيضا أن تكون مشكلة خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب.
- الإحساس بالنشاط

الاثار الجانبية الأكثر شيوعا للبالينوزارهى:

- دوخة
- رؤية ضبابية
- ويادة الوزن
- نعاس
- صعوبة فى التركيز
- تورم اليدين و القدمين
- فم جاف

ما الذى يجب أن أخبر به الطبيب قبل تناول بالينوزار ؟

التحذيرات و الاحتياطات

استشر طبيبك أو الصيدلى قبل تناول بريجبالين

تشير تقارير الى حدوث صعوبات فى التنفس. إذا كنت تعانى من اضطرابات فى الجهاز العصبى، أو اضطرابات فى الجهاز التنفسى، أو قصور فى وظائف الكلى، أو كنت تبلغ من العمر أكثر من ٦٥ عاماً، فقد يلجأ الطبيب لتعديل نظام الجرعات الخاصة بك. اتصل بطبيبك إذا كنت تعانى من صعوبة فى التنفس أو ضعف التنفس

قبل تناول بالينوزار أخبرطبيبك عن كل الظروف الطبية الخاصة بك،بما في ذلك في الحالات التالية:

- لديك أو كان لديك مشكلات في الحالة المزاجية أو أفكارانتحارية أو مشاكل فى السلوك

- لديك مشاكل في الكلى أو قمت بعمل غسيل كلوى
- لديك مشاكل في القلب بما في ذلك فشل عضلة القلب
- لديك مشكلة نزيفية أوانخفاض فى عدد صفائح الدم
- أسأت إستخدام الأدوية التى وصفها الطبيب أو أدوية بدون وصف الطبيب أو الكحول في الماضي
- حدث لك من قبل تورم فى الوجه، الفم، اللسان،الشفتين واللثة والرقبة أوالحلق (تورم فى الأوعية الدموية)
- إذا كنت تخطط لتكون أب. فقد أظهرت الدراسات على الحيوانات أن البريجابالين العنصرالنشط في بالينوزار،جعلت الحيوانات الذكورأقل خصوبة وتسببت فى حدوث تغيرفي الحيواناتالمنوية. أيضا أظهرت الدراسات على الحيوانات عيوب خلقية في المواليد من ذكورالحيوانات الذين تم علاجهم ببريجابالين. ومنغيرالمعروف ما إذا كانت هذه المشاكل يمكن أنت حدث في الناس الذين يتناولون بريجابالين.

إذا كنتى حاملاً وتخططين لحدوث حمل. فإنه منغيرالمعروف ما إذا بالينوزار سوف يضر الجنين أم لا.
أنت وطبيبك سوف تقرران ما إذا كان يجب أن تتناولين بالينوزارأثناء الحمل أم لا.

إذا كنتى ترضعين طبيعياً أو تخططين لذلك. فإن بالينوزار يعبر إلى لبن الأم. ومن غير المعروف ما إذا بالينوزار يمكن أن يضر طفلك أم لا.
تحدثى مع طبيبك حول أفضل طريقة لتغذية طفلك إذا كنتى تتناولين بالينوزار. لا ينصح بالرضاعة الطبيعية مع تناول بالينوزار.

أخبر طبيبك عن جميع الأدوية التي تتناولها، بما في ذلك الأدوية التى وصفها الطبيب والتى بدون وصفة طبية والفيتامينات أو المكملات العشبية. تناول بالينوزارمع الأدوية الأخرى قد يؤثروا على بعضهم البعض مما يتسبب فى حدوث آثارجانبية. أخبر طبيبك خاصة إذا كنت تتناول:

- مثبطات الأنزيم الذى يقوم بتحويل الأنجيوتنسين والتي تستخدم لعلاج العديد من الحالات بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم. فإن هي كون لديك فرصة أكبر لحدوث ورم مرتفع عن سطح الجلد إذا تم تناول هذه الأدوية مع بالينوزار. راجع "ماهي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن بالينوزار؟"
- أفانديا (روزيجليتازون)،أفانداميت (الذى يحتوي على روزيجليتازون و الميتفورمين)،أو أكتوس (بيوجليتازون) لعلاج مرض السكر. فإنه قد يكون لديك فرصة أكبر لزيادة الوزن أو تورم اليدين أو القدمين إذا تم تناول هذه الأدوية مع بالينوزار. راجع "ما هي الآثارالجانبية المحتملة لبالينوزار؟"
- أي أدوية مسكنة للألم (مثل أوكسيكودون)،المهدئات أو الأدوية التى تعالج القلق (مثل لورازيبام). قد يكون لديك فرصة أكبر لحدوث دوخة و نعاس إذا تم تناول هذه الأدوية مع بالينوزار.
- أي أدوية تجعلك تشعر بالنوم

كن على علم بالأدوية التي تتناولها. إحتفظ بقائمة الأدوية مع كل إظهارها لطبيبك و الصيدلي في كل مرة تذهب للحصول على الدواء الجديد. لا تبدأ دواء جديد دون إستشارة طبيبك.

ما الذى يجب تجنبه أثناء تناول بالينوزار؟

- لا تقود سيارة أو تتعامل مع الآلات أو تقوم بأنشطة أخرى خطيرة حتى تعرف كيف يؤثر بالينوزار عليك.
- لا تشرب الكحول أثناء تناول بالينوزار. بالينوزار والكحول يمكن أن تؤثران على بعضها البعض، ويؤدى إلى زيادة الآثار الجانبية مثل النعاس و الدوخة.

ماهي أهم المعلومات التي يجب معرفتها عن بالينوزار؟

بالينوزارقد يتسبب في آثار جانبية خطيرة بما في ذلك:

- حساسية شديدة،أحيانا قد تكون مهددة للحياة
- الأفكارأوالأفعال الانتحارية
- تورم اليدين والساقين والقدمين
- الدوخة و النعاس

وتوصف هذه الآثار الجانبية الخطيرة التالية:
حساسية شديدة،أحيانا قد تكون مهددة للحياة
توقف عن تناول بالينوزارو استدعى الطبيب على الفور إذا كان لديك أي من أعراض الحساسية الشديدة:
تورم الوجه و الفم والشفتين واللثة واللسان و الحلق أو الرقبة
صعوبة في التنفس
طفح جلدي بارز عن سطح الجلد (نتوءات) أوبثور

مثل كل العقاقيرالمضادة للصرع الأخرى،قد يتسبب بالينوزار فى بعض الأفكار أو الأفعال الانتحارية في عدد قليل جدا من الناس حوالي ١ في كل ٥٠٠ مريض.
استدعى مقدم الرعاية الصحية على الفور إذا كان لديك أي من هذه الأعراض،و خاصة إذا كانت جديدة،أسوأ أو تقلقك:
أفكار حول الانتحار أوالموت
محاولة الانتحار
الاكتئاب مستحدث أو سيئ
قلق مستحدث أو سيئ
شعور بالإرتباك أوعدم الراحة
نوبات هلع
صعوبة في النوم (الأرق)
التهيج مستحدث أو أسوأ
التعامل بعدوانية،و يصبح الشخص غاضب أو عنيف
التعامل بنوبات عصبية خطيرة
زيادة بالغة في النشاط والكلام (الهوس)

إذا كان لديك أفكار أو أفعال انتحارية،لا تتوقف عن تناول بالينوزار بدون استشارة الطبيب.
التوقف عن تناول بالينوزارفجأة يمكن أن يسبب مشاكل خطيرة

كيف يمكنني مشاهدة الأعراض الأولية من الأفكار و الأفعال الانتحارية؟

- الإنتباه إلى أي تغيرات، وخاصة التغيرات المفاجئة في المزاج و السلوك و الأفكار أو الشعور.
- الحفاظ على كل زيارات المتابعة مع طبيبك كما كان مقررا.
- اتصل بطبيبك بين الزيارات حسب الحاجة، لاسيما إذا كنت قلقا بسبب الأعراض.

معلومات عامة عن بالينوزار :

توصف الأدوية في بعض الأحيان لأغراض أخرى غير تلك المذكورة في النشرة.لا تستخدم بالينوزارلحالة لم يوصف لها.
لاتعطي بالينوزار لأشخاص آخرين، حتى إذا كان لديهم نفس الأعراض لديك. فإنه قد يضرهم.
تلخص هذة النشرة أهم المعلومات عن بالينوزار. إذا كنت ترغب في مزيد من المعلومات،و التحدث مع طبيبك. يمكنك أن تطلب من طبيبك أو الصيدلي الحصول على معلومات أخرى عن بالينوزار مما هو مكتوب للأطباء.

العبوه :

بالينوزار ٧٥ مجم

علبة كرتون تحتوى على شريطين كل شريط به ١٠ كبسولات جيلاتينية صلبة

بالينوزار ١٥٠ مجم

علبة كرتون تحتوى على شريطين كل شريط به ١٠ كبسولات جيلاتينية صلبة

كيف يمكننى تخزين بالينوزار؟

يحفظ فى درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠°م فى مكان جاف

إنتاج شركة فارما كيور للصناعات الدوائية