

فارمايبلاست

بيلاستين ٢٠ مجم

أقراص

- اقرأ هذه النشرة كاملة و بعناية قبل البدء في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك .
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
 - إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
 - تم وصف هذا الدواء لك فقط فلا تصفه للآخرين فقد يسبب ضرر لهم ، حتى لو كان لديهم نفس الأعراض.
 - إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية ، أو لاحظت أي آثار جانبية غير موجودة بهذه النشرة من فضلك أخبر الطبيب أو الصيدلي .

محتويات النشرة:

١. ما هو فارمايبلاست وما هي دواعي استخدامه ؟
٢. ما الذي تحتاج إلى معرفته قبل تناول فارمايبلاست ؟
٣. كيفية تناول فارمايبلاست ؟
٤. الآثار الجانبية المحتملة ؟
٥. كيفية تخزين فارمايبلاست ؟
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى .

١. ما هو فارمايبلاست وما هي دواعي استخدامه ؟

يحتوي فارمايبلاست على المادة الفعالة بيلاستين وهو مضاد للهستامين.

يستخدم فارمايبلاست ٢٠ مجم لتخفيف أعراض حمى القش (العطس ، والحكة ، والرشح ، وانسداد الأنف ، وعيون حمراء ودامعة) والأنواع الأخرى من التهاب الأنف التحسسي.

ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج الطفح الجلدي المثير للحكة (الأرتكارييا أو الشرى) .

٢. ما الذي يجب أن تعرفه قبل تناول فارمايبلاست ٢٠ مجم ؟

لا تتناول فارمايبلاست

إذا كنت تعاني من حساسية تجاه مادة الفعالة بيلاستين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (للمزيد من المعلومات انظر قسم ٦).

التحذيرات و الاحتياطات :

- برجاء اخبار طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام فارمايبلاست ٢٠مجم إذا كنت تعاني من:
- اعتلال كلوي متوسط أو شديد بالإضافة إلى أنك تتناول أدوية أخرى (انظر "الأدوية الأخرى و فارمايبلاست)
- لا تعط هذا الدواء للأطفال دون سن ١٢ سنة.
- لا تتجاوز الجرعة الموصى بها. إذا استمرت الاعراض استشير طبيبك.

الأدوية الأخرى و فارمايبلاست :

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرًا أو قد تتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية.

على وجه الخصوص ، يرجى التحدث مع طبيبك إذا كنت تتناول أيًا من الأدوية التالية:

- كيتوكونازول (دواء مضاد للفطريات)
- الاريثروميسين (مضاد حيوي)
- ديلتيازيم (لعلاج الذبحة الصدرية).
- السيكلوسبورين (لتقليل نشاط الجهاز المناعي ، وبالتالي تجنب رفض الجسم للأعضاء المزروعة أو الحد من نشاط المرض في اضطرابات المناعة الذاتية والتحسسية ، مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي أو التهاب المفاصل الروماتويدي)
- ريتونافير (لعلاج الإيدز).
- ريفامبيسين (مضاد حيوي)

تناول فارمايبلاست ٢٠ مجم مع الطعام والشراب والكحول :

لا ينبغي أن تؤخذ هذه الأقراص مع الطعام أو مع عصير الجريب فروت أو عصائر الفواكه الأخرى ، لأن ذلك سيققل من تأثير بيلاستين.

لتجنب ذلك يمكنك:

- تناول القرص وانتظر لمدة ساعة قبل تناول الطعام أو عصير الفاكهة أو إذا تناولت طعاماً أو عصير فواكه ، فانتظر لمدة ساعتين قبل تناول القرص .
- لا يزيد البيلاستين بالجرعة الموصى بها (٢٠ مجم) من النعاس الناتج عن الكحول.

الحمل والرضاعة الطبيعية والخصوبة :

لا توجد بيانات أو كمية البيانات المتوفرة محدودة عن استخدام البيلاستين في النساء الحوامل وأثناء الرضاعة الطبيعية وعلى التأثير على الخصوبة إذا كنت حاملاً أو مرضعة ، تعتقد أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل ، اسأل طبيبك للنصيحة قبل تناول فارمايلاست
اسأل طبيبك أو الصيدلي قبل تناول أي دواء.

القيادة و استخدام الآلات :

لقد ثبت أن بيلاستين ٢٠ مجم لا يؤثر على أداء القيادة عند البالغين. ومع ذلك قد تختلف استجابة كل مريض للدواء. لذلك يجب عليك التحقق من مدى تأثير هذا الدواء عليك قبل القيادة أو تشغيل الآلات.

٣. كيفية تناول فارمايلاست ٢٠ مجم :

- احرص دائماً على تناول هذا الدواء تماماً كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.
- الجرعة الموصى بها للبالغين ، بما في ذلك كبار السن والمراهقون الذين تزيد أعمارهم عن ١٢ عامًا : قرص واحد (٢٠ مجم) يوميًا .
- يجب تناول القرص قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من تناول الطعام أو عصير الفاكهة (انظر القسم ٢ ، تناول الدواء مع الطعام والشراب والكحول ") .
- ابتلع القرص كاملاً مع كوب من الماء.
- فيما يتعلق بمدة العلاج ، سيحدد طبيبك نوع المرض الذي تعاني منه وسيحدد مدة العلاج بفارمايلاست ٢٠ مجم.
- الاستخدام في الأطفال :
- قد تكون مستحضرات صيدلية أخرى من مادة الفعالة بيلاستين ملائمة للأطفال من سن ٦ إلى ١١ عامًا مع وزن جسم لا يقل عن ٢٠ كجم ، و لا بد من استشارة طبيبك أو الصيدلي.
- لا تعط مادة البيلاستين للأطفال دون سن ٦ سنوات الذين يقل وزنهم عن ٢٠ كجم حيث لا تتوفر بيانات كافية.

إذا تناولت فارمايلاست ٢٠ مجم بجرعة أكثر مما يجب :

إذا تناولت أنت أو أى شخص أكثر مما ينبغي من أقراص فارمايلاست ٢٠ مجم فقم بالاتصال بطبيبك أو الصيدلي على الفور أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك. من فضلك تذكر أن تأخذ معك علبة الدواء أو هذه النشرة معك.

إذا نسيت تناول فارمايلاست ٢٠ مجم :

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا نسيت تناول جرعتك في الوقت المحدد ، فتناولها في أقرب وقت ممكن ، ثم عد إلى جدول الجرعات المعتاد.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة :

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا كنت تعاني من أعراض رد فعل تحسسي والتي قد تشمل علاماتها صعوبة في التنفس ، و الدوار ، والانهيار أو فقدان الوعي ، وتورم وجهك ، والشفنتين واللسان أو الحلق ، و / أو تورم واحمرار الجلد ، توقف عن تناول الدواء. واطلب الاستشارة الطبية العاجلة على الفور.

الآثار الجانبية الأخرى التي قد تحدث عند البالغين والمراهقين هي:

شائعة قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص :

• صداع الراس

• النعاس

غير شائعة قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص :

• مخطط غير طبيعي لرسم كهربية القلب.

• اختبارات الدم التي تظهر التغيرات في وظيفة الكبد .

• دوام

• آلام المعدة

• التعب

• زيادة الشهية

- اختلال ضربات القلب
- زيادة الوزن
- الغثيان (الشعور بالاعياء)
- القلق
- جفاف او عدم ارتياح الأنف
- آلام البطن
- إسهال
- التهاب المعدة (التهاب جدار المعدة)
- الدوار (شعور بالدوار أو الدوران)
- الشعور بالضعف
- العطش
- ضيق التنفس (صعوبة في التنفس)
- جفاف الفم
- عسر الهضم
- حكة
- قروح الزكام (الهربس الفموي)
- حمى
- طنين الأذن (رنين في الأذنين)
- صعوبة فى النوم
- تحاليل الدم التي تظهر التغيرات في وظيفة الكلى
- زيادة نسبة الدهون في الدم
- التردد غير معروف: لا يمكن تقديره من البيانات المتاحة
- الخفقان (الشعور بضربات قلبك)
- تسرع القلب (ضربات قلب سريعة)
- القيء

الآثار الجانبية التي قد يعاني منها الأطفال هي:

شائعة قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص :

- التهاب الأنف (تهيج الأنف)
- التهاب الملتحمة التحسسي (تهيج العين)
- صداع الراس
- آلام في المعدة (آلام في البطن / أعلى البطن)
- غير شائعة قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص :
- تهيج العين
- دوار
- فقدان الوعي
- إسهال
- الغثيان (الشعور بالاعياء)
- تورم الشفاه
- الأكزيما
- ارتيكاريا (الشرى)
- تعب

التبليغ عن الآثار الجانبية :

إذا ظهرت لديك أي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً

الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر مركز مركز الیقظة الصيدلانية المصري الموقع الإلكتروني PV.followup@edaegypt.gov.eg

أو عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالشركة : Info@pharmacureonline.com

٥. كيفية تخزين فارمايلاست ٢٠ مجم :

يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠ درجة مئوية في مكان جاف
احفظ هذا الدواء بعيداً عن نظر ومتناول أيدي الأطفال.
لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون بعد EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.
لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ومن شأن هذه التدابير أن تساعد على حماية البيئة
مدة الصلاحية : عامان

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى:

ما هي مكونات فارمابيلاست ٢٠ مجم :

كل قرص يحتوي علي :

المادة الفعالة : بيبلاستين ٢٠ مجم

المواد الغير فعالة:

• سيليلوز دقيق التبلور PH 102

• نشا جليكولات الصوديوم

• ثاني أكسيد السيليكون الغروي (Aerosil 200)

• ستيرات الماغنسيوم

كيف تبدو أقراص فارمابيلاست : أقراص مستديرة بيضاء ثنائية التحذب.

العبوة :

علبة كرتون تحتوي علي شريطين (ألومنيوم/بي في سي / بي في دي سي شفاف عديم اللون) يحتوي كل شريط على ١٠ اقراص + نشرة داخلية

المصنع وصاحب الرخصة :فارما كيور للصناعات الدوائية

تاريخ مراجعة النشرة من قبل هيئة الدواء المصرية: فبراير ٢٠٢٣