

فارمايبلاست
بيلاستين ٢,٥ مجم / مللى
محلول للتناول عن طريق الفم

- للأطفال من سن ٦ إلى ١١ سنة بوزن لا يقل عن ٢٠ كجم
اقرأ هذه النشرة بالكامل بعناية قبل أن يبدأ طفلك في تناول هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة بالنسبة لك.
- احتفظ بهذه النشرة. قد تحتاج لقراءتها مرة أخرى.
- إذا كانت لديك أسئلة أخرى ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.
- وصف هذا الدواء لطفلك. لا توصفه للآخرين. فقد يضرهم ، حتى لو كانت علامات مرضهم مماثلة لمرض طفلك.
- إذا أصيب طفلك بأي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. انظر القسم ٤.

محتويات هذه النشرة

١. ما هو فارمايبلاست وما هي دواعي استخدامه
٢. ما الذى تحتاج إلى معرفته قبل تناول فارمايبلاست
٣. كيف تتناول فارمايبلاست
٤. الآثار الجانبية المحتملة
٥. كيفية تخزين فارمايبلاست
٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

١. ما هو فارمايبلاست وما هي دواعي استخدامه

يحتوي فارمايبلاست على المادة الفعالة بيلاستين وهو مضاد للهستامين.
يستخدم فارمايبلاست لتخفيف أعراض حمى القش (العطس ، والحكة ، والرشح ، وانسداد الأنف ، والعيون الحمراء الدامعة)
وأشكال أخرى من التهاب الأنف التحسسي (حساسية الانف). ويمكن استخدامه أيضًا لعلاج الطفح الجلدي المثير للحكة (الشرى أو الارتيكاريا).

يستخدم فارمايبلاست ٢,٥ مجم / مللى للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ٦ إلى ١١ عامًا بوزن لا يقل عن ٢٠ كجم.

٢. ما الذى تحتاج إلى معرفته قبل استخدام فارمايبلاست

لا تستخدم فارمايبلاست:

- إذا كان طفلك يعاني من حساسية تجاه مادة البيلاستين أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء (المدرجة في القسم ٦).

المحاذير والإحتياطات

تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام فارمايبلاست إذا كان طفلك يعاني من خلل فى الكلى أو الكبد متوسط أو شديد أو إذا كان طفلك يتناول أدوية أخرى (انظر "أدوية أخرى و فارمايبلاست").

الأطفال

لا تعط هذا الدواء للأطفال دون سن ٦ سنوات الذين يقل وزنهم عن ٢٠ كجم حيث لا تتوفر بيانات كافية.

أدوية أخرى و فارمايبلاست

أخبر طبيبك أو الصيدلي إذا كان طفلك يتناول أو تناول مؤخرًا أو قد يتناول أي أدوية أخرى ، بما في ذلك الأدوية التي تم الحصول عليها بدون وصفة طبية. لا ينبغي تناول بعض الأدوية معًا وقد يحتاج البعض الآخر إلى تغيير جرعاتها عند تناولها معًا.

أخبر طبيبك أو الصيدلي دائمًا إذا كان طفلك يستخدم أو يتلقى أيًا من الأدوية التالية بالإضافة إلى فارمايبلاست:

- كيتوكونازول (دواء مضاد للفطريات)
- الاريثروميسين (مضاد حيوي)
- ديلتيازيم (لعلاج الذبحة الصدرية - ألم أو ضيق في منطقة الصدر)
- السيكلوسبورين (لتقليل نشاط الجهاز المناعي ، وبالتالي تجنب رفض الزرع أو تقليل نشاط المرض في أمراض المناعة الذاتية والحساسية ، مثل الصدفية والتهاب الجلد التأتبي والتهاب المفاصل الروماتويدي)
- ريتونافير (لعلاج الإيدز).
- ريفامبيسين (مضاد حيوي)

فارمايبلاست مع الطعام والشراب والكحول

لا ينبغي تناول فارمايبلاست مع الطعام أو مع عصير الجريب فروت أو عصائر الفاكهة الأخرى ، لأن ذلك سيققل من تأثير مادة البيلاستين. لتجنب ذلك يمكنك:

- إعطاء طفلك فارمايبلاست وانتظر لمدة ساعة قبل أن يتناول طفلك الطعام أو عصير الفاكهة
- أو إذا تناول طفلك طعامًا أو عصير فواكه ، فانتظر لمدة ساعتين قبل إعطائه فارمايبلاست

لا يزيد البيلاستين من النعاس الناتج عن الكحول بالجرعة الموصى بها للبالغين (٢٠ مجم).

الحمل والرضاعة والخصوبة

يستخدم هذا الدواء للأطفال من سن ٦ إلى ١١ عامًا الذين لا يقل وزنهم عن ٢٠ كجم. ومع ذلك ، يجب ملاحظة المعلومات التالية فيما يتعلق باستخدام الأمان لهذا الدواء. لا توجد بيانات كافية عن استخدام البيلاستين في النساء الحوامل وأثناء الرضاعة الطبيعية وعن التأثيرات على الخصوبة.

في حالة الحمل أو الإرضاع ، أو عند التخطيط لإنجاب طفل ، يوصى باستشارة الطبيب قبل تناول هذا الدواء. اسأل طبيبك أو الصيدلي للحصول على المشورة قبل تناول أي دواء.

القيادة واستخدام الآلات

لقد ثبت أن البيلاستين بجرعة ٢٠ مجم لا يؤثر على أداء القيادة عند البالغين. ومع ذلك ، قد تختلف استجابة كل مريض للدواء. لذلك يجب عليك التحقق من كيفية تأثير هذا الدواء على طفلك ، قبل أن تسمح لطفلك بركوب الدراجات أو قيادة المركبات الأخرى أو تشغيل الآلات.

يحتوي فارمايبلاست على ميثيل باراهيدروكسي بنزوات و بروبييل باراهيدروكسي بنزوات الذي قد يسبب تفاعلات حساسية (ربما تتأخر).

يحتوي فارمايبلاست على الصوديوم

يحتوي هذا الدواء على أقل من ١ مليمول صوديوم (٢٣ مجم) لكل ٤ مللى ، وهذا يعني بشكل أساسي "خالٍ من الصوديوم".

٣. كيف تتناول فارمايبلاست

استخدم هذا الدواء دائمًا تمامًا كما أخبرك طبيبك أو الصيدلي. استشر طبيبك أو الصيدلي إذا لم تكن متأكدًا.

الإستخدام في الأطفال

الجرعة الموصى بها للأطفال من سن ٦ إلى ١١ سنة مع وزن جسم لا يقل عن ٢٠ كجم هي ١٠ مجم من البيلاستين (٤ مل مرة فارمايبلاست بجرعة واحدة يوميًا للتخفيف من أعراض التهاب الملتحمة الأنفي التحسسي والشرى (الارتيكاريا).

لا تعط هذا الدواء للأطفال دون سن ٦ سنوات الذين يقل وزنهم عن ٢٠ كجم حيث لا تتوفر بيانات كافية للبالغين ، بما في ذلك كبار السن والمراهقون بعمر ١٢ سنة وما فوق ، الجرعة الموصى بها هي ٢٠ مجم من بيلاستين مرة واحدة يوميًا. بالنسبة لهؤلاء المرضى ، يتوفر أشكال صيدلية ملائمة أكثر لهم على شكل أقراص ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

- فارمايبلاست للاستخدام الفموي
- يجب أن تعطى فارمايبلاست لطفلك قبل ساعة واحدة أو بعد ساعتين من تناول طفلك أي طعام أو عصير فواكه.

نظرًا لأن مدة العلاج تعتمد على المرض الأساسي لطفلك ، فإن طبيبك سيحدد المدة التي يجب أن يأخذ فيها طفلك فارمايبلاست

إذا كنت تستخدم فارمايبلاست أكثر مما ينبغي

إذا استخدم طفلك أو أي شخص آخر الكثير من هذا الدواء ، أخبر طبيبك على الفور أو اذهب إلى قسم الطوارئ في أقرب مستشفى لك. من فضلك تذكر أن تأخذ معك عبوة الدواء أو هذه النشرة معك.

إذا نسيت استخدام فارمايبلاست

إذا نسيت إعطاء طفلك الجرعة اليومية في الوقت المحدد ، فقم بإعطائها في نفس اليوم بمجرد أن تتذكرها. ثم يعطى الجرعة التالية في اليوم التالي في الوقت المعتاد حسب إرشادات الطبيب. على أي حال ، لا تعط جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة المنسية.

إذا توقفت عن استخدام فارمايبلاست

بشكل عام ، لن تكون هناك آثار لاحقة عند توقف العلاج بفارمايبلاست. إذا كان لديك أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء ، اسأل طبيبك أو الصيدلي.

٤. الآثار الجانبية المحتملة

مثل جميع الأدوية ، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية ، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع. إذا كان طفلك يعاني من أعراض رد فعل تحسسي قد تشمل علاماته صعوبة في التنفس ، والدوخة ، وانهيار أو فقدان الوعي ، وتورم في الوجه ، والشفتين ، واللسان أو الحلق ، و / أو تورم واحمرار الجلد ، فتوقف عن إعطاء الدواء و اطلب المشورة الطبية العاجلة على الفور.

الآثار الجانبية الأخرى التي قد يعاني منها الأطفال هي:

شائعة: قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص

- التهاب الأنف (تهيج الأنف)
- التهاب الملتحمة التحسسي (تهيج العين)
- صداع الراس
- آلام في المعدة (بطني - / آلام في الجزء العلوي من البطن)

غير شائعة: قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص

- تهيج العين
- دوام
- فقدان الوعي
- إسهال
- الغثيان (الشعور بالاعياء)
- انتفاخ الشفتين
- الأكزيما
- حكة جلدية (شري/ارتيكاريا)
- ضعف أو وهن

الآثار الجانبية التي قد تظهر لدى البالغين والمراهقين هي:
شائعة: قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠ أشخاص

- صداع الراس
- النعاس

غير شائعة: قد تظهر لدى حتى ١ من كل ١٠٠ شخص

- رسم القلب (مخطط كهربية القلب) غير طبيعي
- تحاليل الدم تظهر تغيرات في وظائف الكبد
- دوام
- آلام في المعدة
- التعب
- زيادة الشهية
- عدم انتظام ضربات القلب
- زيادة الوزن
- الغثيان (الشعور بالاعياء)
- القلق
- جفاف الأنف أو الشعور بعدم الراحة في الانف
- آلام البطن
- إسهال
- التهاب المعدة (التهاب جدار المعدة)
- دوام (الشعور بالدوخة أو الدوران)
- الشعور بالضعف
- الاحساس بالعطش
- ضيق التنفس (صعوبة في التنفس)
- جفاف الفم
- عسر الهضم
- حكة
- قروح البرد (المهربس الفموي)
- حمى
- طنين الأذن (رنين في الأذنين)
- صعوبة النوم
- تحاليل الدم التي تظهر تغيرات في طريقة عمل الكلى
- زيادة نسبة الدهون في الدم

التردد غير معروف: لا يمكن تقديره من البيانات المتاحة

- خفقان (الشعور بضربات قلبك)
- عدم انتظام دقات القلب (ضربات قلب سريعة)
- قيء

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا أصيب طفلك بأي آثار جانبية ، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلي. يتضمن ذلك أي آثار جانبية محتملة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنك أيضاً الإبلاغ عن الآثار الجانبية مباشرةً عبر مركز اليقظة الدوائية المصري أو عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى

PV.followup@edaegypt.gov.eg

أو على البريد الإلكتروني الخاص بقسم اليقظة الدوائية بالشركة pharmacovigilance@pharmacureonline.com من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية ، يمكنك المساعدة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

٥. كيفية تخزين فارمابيلاست

-احفظ هذا الدواء بعيداً عن أنظار ومتناول أيدي الأطفال.
-لا تستخدم هذا الدواء بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المدون على الكرتون والزجاجة بعد EXP. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

-يحفظ في درجة حرارة لا تزيد عن ٣٠م
لا تتخلص من الأدوية في مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

الصلاحية: انظر العبوة الخارجية

٦. محتويات العبوة ومعلومات أخرى

على ماذا يحتوي فارمابيلاست

- المادة الفعالة هي البيلاستين. يحتوي كل مللي من الدواء على ٢,٥ مجم من البيلاستين.
- المكونات الأخرى هي ماكروغول (٦٠٠٠) ، ميثيل باراهيدروكسي بنزوات (ميثيل بارابين) ، بروبييل باراهيدروكسي بنزوات (بروبييل بارابين) ، جليسرول (جلسرين) ، سكرالوز ، حمض الهيدروكلوريك المخفف ١٠٪ -هيدروكسيد الصوديوم لضبط الاس الهيدروجيني)، نكهة توت احمر (يحتوي علي أحادي بروبيلين الجليكول) ، ماء منقى

كيف يبدو فارمابيلاست وما هي محتويات العبوة

محلول فارمابيلاست هو محلول فموي شفاف صافي متجانس برائحة مميزة

عبوة كرتونية تحتوي علي زجاجة كهربائية (زجاج من النوع الثالث) تحتوي على ١٢٠ مللي محلول للتناول عن طريق الفم مغطاة بغطاء بلاستيكي (بولي إيثيلين عالي الكثافة) يحتوي على طبقة تفلون داخلي مغطى بالبولي إيثيلين على كلا الجانبين.

-المصنع ومالك الرخصة:

فارماكيور للصناعات الدوائية

تاريخ مراجعة النشرة من هيئة الدواء المصرية: ٢٠٢٣/٢/٢٦