

رينوكالم أقراص

باراسيتامول ٦٥٠ مجم , سودوإفدرين هيدروكلوريد ٦٠ مجم , كلورفينرامين ماليات ٤ مجم

أقراص

الوصف الفيزيائي:

أقراص بيضاء مستطيلة الشكل مشقوقة من جانب واحد

التركيب:

يحتوى كل قرص على:

المواد الفعالة :

أسيتامينوفين (باراسيتامول) ٦٥٠ مجم

سودو إفدرين هيدروكلوريد ٦٠ مجم

كلورفينرامين ماليات ٤ مجم

المواد غير الفعالة:

كورسكارميلوز ، بوفيدون K25، ماغنسيوم ستيرات ، ميكروكريستالين سليولوز (١٠٢،١٠١).

آلية العمل:

يجمع رينوكالم بين تأثيرات مكوناته كالتالى:

- أسيتامينوفين يعمل كمخفف للألم والحمى.

- كلورفينرامين ماليات يعمل كمضاد للهستامين.

- سودوإفدرين هيدروكلوريد يزيل احتقان الأنف.

دواعى الاستعمال:

يستخدم رينوكالم لعلاج الأعراض المصاحبة لنزلات البرد وحمى القش:

-الرشح و العطس.

-إحتقان الأنف.

-الأوجاع و الألام البسيطة .

- صداع .

- إحتقان الجيوب الأنفية والضغط.

وتخفيف هذه الأعراض الإضافية المصاحبة لحمى القش:

- حكة الأنف أو الحلق.

- حكة وتدميع العينين.

- للمساعدة على فتح الممرات الأنفية.

الجرعى وطريقة الاستعمال:

لا يجب أن تزيد الجرعة عن الجرعة الموصى بها.

البالغين والأطفال من سن ١٢ سنة فأكثر:

قرص واحد ٣ مرات كل ٨ ساعات.

يبلع القرص كاملاً مرة واحدة - لا يسحق ولا يمضغ ولا يذاب.

لا تتناول أكثر من ٣ أقراص في ٢٤ ساعة.

موانع الاستعمال:

حساسية لأي من مكونات رينوكالم

الأطفال أقل من ١٢ سنة.

التفاعلات الدوائية:

لا يجب استعمال رينوكالم مع:

أى دواء آخر يحتوى على أسيتامينوفين (الأدوية الموصوفة أو غير الموصوفة). إذا كنت غير متأكد عما إذا كان الدواء يحتوى على أسيتامينوفين أم لا، إستشر الطبيب أو الصيدلى.

مثبطات الأوكسيداز أحادى الأمين (بعض الأدوية لعلاج الإكتئاب، الحالات النفسية أو العاطفية، أو أمراض باركنسون)، أو لمدة أسبوعين بعد وقف استعمال دواء مثبط للأوكسيداز أحادى الأمين. إذا كنت لاتعرف عما إذا كان الدواء الموصوف لك يحتوى على دواء مثبط للأوكسيداز أحادى الأمين أم لا ، إسأل الطبيب أو الصيدلى قبل تناول الدواء.

الإحتياطات والتحذيرات:

تم الإبلاغ عن اعتلال عصب العين (الاعتلال العصبي البصري الإقفاري) مع استخدام سودوافدرين. إذا شعرت بفقدان مفاجئ للرؤية أو نقص حدة الرؤية مثل حدوث عتمة توقف عن أخذ الدواء واتصل بالطبيب لتلقي المساعدة الطبية فوراً

الآثار العكسية المرتبطة باستخدام سودوافدرين: اضطرابات العين: معدل التكرار غير معروف: الإعتلال العصبي البصري الإقفاري.

نوبة قلبية، سكتة دماغية، تشنجات، رد فعل جلدي خطير مثل الالتهاب الحبيبي المتعمم الحاد (AGEP)

تحذير خاص بالكبد: يحتوى هذا الدواء على أسيتامينوفين. قد يحدث ضرر شديد للكبد إذا تناولت:

أكثر من ٣ أقراص في ٢٤ ساعة وهو الحد الأقصى من الجرعة اليومية.

أدوية أخرى تحتوى على أسيتامينوفين.

ثلاثة أو أكثر من المشروبات الكحولية بجانب تناول الدواء.

لا يجب استعمال رينوكالم لجعل الطفل ينام.

أسأل الطبيب قبل استعمال الدواء إذا كنت تعاني من:

- مرض كبدى.
- مرض فى القلب.
- جلوكوما.
- مرض فى الغدة الدرقية.
- إرتفاع فى ضغط الدم.
- صعوبة فى التبول بسبب تضخم غدة البروستاتا.
- مشكلة فى التنفس مثل إمفزيما أو التهاب شعبي مزمن.
- داء السكرى.

أسأل الطبيب أو الصيدلى قبل إستعمال الدواء إذا كنت:

- تتناول مسكنات أو مهدئات.
- تتناول وارفارين وهو دواء يعمل على ترقيق الدم.

عندما تستعمل هذا الدواء:

- لا تستعمل جرعة من الدواء تزيد عن الموصى بها.
- يمكن أن يحدث إثارة.
- الكحول والمسكنات والمهدئات قد تزيد من النعاس.
- تجنب المشروبات الكحولية.
- كن حذرا عند قيادة السيارة أو تشغيل الآلات.
- قد يحدث نعاس.

توقف عن إستعمال الدواء واسأل الطبيب إذا:

- حدثت أعراض جديدة.
 - عانيت من عصبية أو دوخة أو نوم.
 - زاد الألم أو إحتقان الأنف أو استمر لأكثر من ٧ أيام.
 - كان هناك إحمرار أو تورم.
 - زادت الحمى أو استمرت لأكثر من ٣ أيام.
 - هذه الأعراض يمكن أن تكون علامات حالة خطيرة.
- الحمل والرضاعة الطبيعية:** أسألى الطبيب قبل الإستعمال.

إذا لزم الأمر ، يمكن استخدامه أثناء الحمل ولكن يجب عليك استخدام أقل جرعة فعالة ممكنة و استخدامها لأقصر وقت ممكن لتقليل الألم أو الحمى . اتصل بطبيبك إذا لم يقل الألم أو الحمى أو إذا كنت بحاجة إلى تناول الدواء بجرعة أعلى.

تشير كمية كبيرة من البيانات عن النساء الحوامل إلى عدم وجود تشوه أو تسمم للمواليد. تظهر الدراسات الوبائية حول النمو العصبي لدى الأطفال المعرضين للباراسيتامول في الرحم نتائج غير حاسمة. إذا لزم الأمر سريريًا، يمكن استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل ولكن يجب استخدامه بأقل جرعة فعالة لأقصر وقت ممكن وبأقل معدل تكرار.

في حالة تناول جرعة زائدة يجب طلب مساعدة طبية.

تعليمات للمريض:

يحفظ الدواء بعيدا عن متناول الأطفال

العبوة والتخزين:

علبة كرتون تحتوي على ٢ شريط (المونيوم -بي فى سى معتم) كل شريط يحتوى على ١٠ أقراص مع نشرة داخلية.

يحفظ في مكان جاف عند درجة حرارة لا تزيد عن 30^oم

مدة الصلاحية: انظر العبوة الخارجية.

المصنع و صاحب الرخصة:

شركة فارماكيور للصناعات الدوائية